



Hérnia Perineal em cães: Revisão de Literatura

José Marques de Aquino Neto¹
Prof. Dr. Marcelo Carrijo da Costa²
Prof. Jônatas Alves de Souza³
Beatriz Nunes Santos⁴

Resumo

Introdução: Hérnia ocorre pelo deslocamento anormal de um órgão causado por um defeito em uma cavidade anatômica. A hérnia perineal, muitas vezes causada por enfraquecimento muscular ou traumas, gera rompimento da musculatura do diafragma pélvico. A maior ocorrência desse caso é em cães machos, acima de 5 anos, não castrados, pois esses apresentam sinais de tenesmo, constipação, disquezia e aumento de volume na região perineal. O diagnóstico é realizado através de anamnese, histórico do animal, palpação, exames complementares, radiografias e ultrassonografias. O tratamento pode ser feito pela herniorrafia tradicional ou pela técnica de transposição do músculo obturador interno, no entanto deve-se realizar uma boa avaliação para escolher a melhor abordagem. **Objetivo:** apresentar uma discussão teórica e evidenciar diversas técnicas cirúrgicas correlacionadas à hérnia perineal em cães. **Metodologia:** Foi realizada pesquisa de revisão de literatura. **Conclusão:** a associação de duas ou mais técnicas, independente da escolha, permite um tratamento de maior eficiência, auxiliando na redução de complicações e no reaparecimento do problema.

Palavras-chaves: Hérnia Perineal, Cirurgia, Cães

¹ Graduando em Medicina Veterinária pelo Centro Universitário Mário Palmério- UNIFUCAMP.

² Professor do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Mário Palmério- UNIFUCAMP

³ Médico Veterinário

⁴ Professora do Centro Universitário Mário Palmério- UNIFUCAMP.